

Prata da Casa:


Uso da chupeta e amamentação exclusiva no Brasil

Ms. Gabriela Buccini
Doutoranda em Nutrição em
Saúde Pública
FSP-USP



#SMAM2016

Magnitude e Tendência do Uso da Chupeta no Brasil



Gabriela dos Santos Buccini^I

Maria Helena D'Aquino
Benício^I

Sonia Ioyama Venancio^{II}

Determinantes do uso de chupeta e mamadeira

Uso da chupeta é influenciado por..



mãe trabalhar fora



não ter sido
amamentado
na primeira
hora



uso do chá no
primeiro dia
em casa.



primiparidade

Pode afetar a saúde da criança

Saúde da criança

Má - oclusão

Respiração Bucal

Otite Média Aguda

Segurança imunológica:


Linguagem oral

Vícios orais na vida adulta

Níveis de Inteligência

Amamentação

Determinantes da duração do AME





Recomendação

Organização Mundial da Saúde IHAC

Passo 9:
**Não oferecer bicos artificiais
ou chupetas a bebês
amamentados**

Declaração Conjunta OMS/UNICEF (1989)

Outras recomendações
American Academy of Pediatrics (APP)
Uso após 15 dias – amamentação estabelecida

Pacifier Use and Exclusive Breastfeeding in Brazil

Gabriela dos Santos Buccini, MsC¹,
Rafael Pérez-Escamilla, PhD², and Sonia Isoyama Venancio, MD, PhD³

Journal of Human Lactation
2016, Vol. 32(3) NP52–NP60
© The Author(s) 2015
Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0890334415609611
jhl.sagepub.com



Abstract

Background: Exclusive breastfeeding (EBF) rates for infants younger than 6 months have increased in Brazil, although at the current pace of improvement it would take 6 years to reach an EBF rate of 50%. Thus, it is important to identify relevant modifiable key risk factors for the premature interruption of EBF.

Objective: This study aimed to find out if pacifier use is an independent risk factor for the interruption of EBF among Brazilian infants.

Methods: We conducted secondary cross-sectional data analyses of 2 waves of infant feeding surveys conducted in 1999 and in 2008 in the Brazilian state capitals and Federal District (N = 42 395 children < 6 months). Multivariate logistic regression was used to test the association between pacifier use and the risk of interruption of EBF in a pooled sample and within each survey wave, adjusting for socioeconomic, demographic, and biomedical confounders.

Results: In the pooled sample, a third of the infants were exclusively breastfed (32.7%) and almost 50% had used a pacifier. Whereas EBF prevalence among infants increased from 25.1% in 1999 to 40.3% in 2008, pacifier use prevalence decreased from 58.5% to 41.6% in the same time period. Pacifier use was strongly associated with the risk of interruption of EBF in 1999 (adjusted odds ratio [AOR] = 2.65; 95% confidence interval [CI], 2.38-2.94), in 2008 (AOR = 3.18; 95% CI, 2.81-3.60), and in the pooled sample (AOR = 2.77; 95% CI, 2.63-2.91) after adjusting for key confounders.

Conclusion: Pacifier use was the strongest risk factor for EBF interruption. Effective strategies to reduce pacifier use among infants younger than 6 months may further improve EBF rates in Brazil.



Investigar se o uso da chupeta é um fator associado a interrupção do AME no período de 1999-2008

Investigaram-se diversos fatores relacionados às práticas de alimentação infantil



Situação da amamentação exclusiva e uso de chupeta

Recordatório de 24hs




2 Inquéritos nacionais menores de 6 meses

PPAM 2008 - 18.929

PPAM 1999 - 24.810

Slide elaborado por Ms. Gabriela Buccini

Evolução do AME e do uso da chupeta entre 1999 e 2008



Crianças que usaram chupeta tiveram 2.77 chances maiores de interrupção do AME

Mecanismos explicativos da relação uso da chupeta e interrupção do AME

1

Introdução
da chupeta

Amamentar
↓
ao dia

Uso diário



Intenso

Independente do período de introdução




Espaçamento das
mamadas

Fisiologia da lactação


Aumento das chances de desmame

2 mecanismos fisiológicos
explicativos



Técnicas de
sucção


Peito



2

Bico ortodôntico

Bico fisiológico




Hipóteses de causalidade




ato de sugar chupeta
iniba a amamentação



desencorajar as mães a
usarem chupetas



Taxas de
amamentação



Mães que têm problemas para
amamentar utilizem as chupetas
para acalmar seus bebês



Necessidade de maior apoio à
amamentação para evitar as situações
que levam as mães a usar chupetas

2
possibilidades
de causalidade
sejam
verdadeiras

Conclusão


Relação inversa entre a prevalência de AME e uso de chupeta



Evidências de que pode-se aumentar as taxas de AME reduzindo o uso de chupeta

Feldens et al., 2014

Estratégias para reduzir chupeta entre menores de 6 meses em AME



1



2



PROs
CONs

3



4



Amamentação e Trabalho
Para dar certo, o compromisso é de todos

Obrigada!
gabibuccini@usp.br

#SMAM2016

WORLD BREASTFEEDING WEEK 2016



ALEITAMENTO MATERNO
PRESENTE SAUDÁVEL, FUTURO SUSTENTÁVEL

